

INFORME TÉCNICO – 14/2020

Orientações para tempo de afastamento de pacientes com suspeita de SG e seus contatos:

Durante investigação ou sem resultado laboratorial:

Sintomático	Assintomático com contato domiciliar de caso suspeito ou confirmado por RT-PCR	Assintomático com contato próximo de caso suspeito ou confirmado por RT-PCR
Afastamento por 10 (dez) dias, a partir do início dos sintomas.	Afastamento por 14 (quatorze) dias, a partir do início dos sintomas do contato.	Não indicado afastamento. Reforçar medidas de prevenção.

Após resultado laboratorial:

	Sintomático	Assintomático com contato domiciliar de caso confirmado	Assintomático sem contato domiciliar de caso confirmado
RT-PCR positivo	Afastamento por 10 (dez) dias, a partir do início dos sintomas.	Afastamento por 10 (dez) dias, a partir da data de coleta.	Afastamento por 10 (dez) dias, a partir da data de coleta.
RT-PCR negativo	Liberar do afastamento, desde que assintomático.	Afastamento por 14 (quatorze) dias, a partir do início dos sintomas do contato.	Não indicado afastamento. Reforçar medidas de prevenção.
Teste sorológico positivo	Afastamento por 10 (dez) dias, a partir do início dos sintomas.	Afastamento por 14 (quatorze) dias, a partir do início dos sintomas do contato.	Não indicado afastamento. Reforçar medidas de prevenção.
Teste sorológico negativo	Afastamento por 10 (dez) dias, a partir do início dos sintomas.	Afastamento por 14 (quatorze) dias, a partir do início dos sintomas do contato.	Não indicado afastamento. Reforçar medidas de prevenção.

Os testes sorológicos não devem ser utilizados de forma isolada como critério de afastamento. Nesses casos, avaliar presença de sintomas ou contato domiciliar com caso positivo por RT-PCR.


Pacientes com RT-PCR positivo devem ficar em isolamento por pelo menos 10 dias. Os sintomáticos devem iniciar a contagem a partir do início dos sintomas e os assintomáticos a partir da data de coleta do exame.


Todos os contatos domiciliares de casos positivos por RT-PCR devem ficar em isolamento por 14 dias, independente de resultado de teste sorológico.

Pacientes assintomáticos sem contato domiciliar com casos suspeitos ou confirmados não necessitam de isolamento unicamente por exames sorológicos positivos. Está indicado isolamento de pacientes com teste sorológico positivo que apresentaram sintomas ou que são contatos domiciliares de casos positivos.

Pacientes que realizaram corretamente o período de afastamento e apresentam remissão dos sintomas por pelo menos 24h, sem necessidade de novo teste. Esses pacientes podem retornar ao trabalho inclusive se outros contatos domiciliares desenvolverem sintomas.

Gravataí, 09 de outubro de 2020.


Gabriela Duarte Ramo
Médica
CRM-RS 39649


Patrícia Silva da Silva
Diretora Departamento de Vigilância em Saúde
Port. 3.586/17